

## Teplomilné druhy brouků i na Jesenicku

Trend šíření teplomilných druhů živočichů (rostlin) lze v posledních letech pozorovat i na Jesenicku. Svědčí o tom nálezy hmyzích druhů, jež do nedávné doby bylo možné pozorovat a chytat až na druhé straně Jeseníků v rovinatých oblastech Olomoucka a Zábřezska (LEMON 1999).

*Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) je asi 10 mm velký, tmavě hnědý zlatohlávek s bílými skvrnkami na štítu i krovkách. Objevuje se od května do července na květech rostlin. V Čechách a na Moravě se v poslední době zjevně šíří (HŮRKA 2005). V červnu 2004 byla v rámci jedné lokality nad Dětřichovem u Jeseníku (480 m n. m.) zjištěna populace mnoha desítek až stovek jedinců. Na stejných místech se hojně vyskytoval také zlatohlávek zlatý (*Cetonia aurata*), méně často zlatohlávek hladký (*Potosia cuprea*). Brouci byli běžní na okolících bršlice a rozkvetlých hlozích. Bylo zřejmé, že výskyt těchto druhů, a zejména *O. funesta*, na malé vyhraněné lokalitě (jen několik stovek metrů dál na květech stejných rostlin nebyl nalezen ani jeden exemplář) byl zapříčiněn přítomností vhodného substrátu, ve kterém se larvy zlatohlávků vyvíjejí. V tomto případě to jsou tlející a zarůstající hromady pilin. Druh *O. funesta* se na lokalitě hojně vyskytoval také v létě 2005 a 2006. V červenci 2006 byl nalezen jeden exemplář na Holém vrchu (750 m n. m.) nad Heřmanovicemi (okr. Bruntál), v červenci 2007 rovněž 1 ks při okraji lesa na úbočí Křemenáče (500 m n. m.) nad Písečnou. Nedávné nálezy *Oxythyrea funesta* v létě 2006 u osady Drakov (Heřmanovice) podrobně popisuje CHYBÍK (2007)

*Valgus hemipterus* (Linné, 1758) je brouk rovněž z příbuzenstva zlatohlávků. Je 6 - 9 mm velký, černohnědý s bílou kresbou; typický zkrácenými krovkami, které nezakrývají celý zadeček. Jeho larvy se vyvíjejí v trouchnivých stromech. Dospělí brouci se objevují od jara do začátku léta na květech. V květnu 2004 byl nalezen jeden exemplář v zámeckém parku v Javorníku a v červnu 2006 další jedinec na louce nad Horními Hořticemi. Před rokem 2004 nebyl pravděpodobně tento druh na Jesenicku pozorován (NOVÁK, ústní sdělení).



*Oxythyrea funesta*, *Valgus hemipterus*

**Literatura:**

HŮRKA K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, 391 p., Zlín.

CHYBÍK J. (2007): Zlatohlávek *Oxythyrea funesta* v Jeseníkách. Veronica, č.5/07: p. 25 – 26.

LEMON F. (1999): Kudlanka nábožná v Jeseníku. Ročenka Vlastivědné muzejní společnosti v Jeseníku: p. 36, VMJ, Jeseník.